

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-8-65 405900

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES, (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

ANNEXE AU BULLETIN N° 59

12 AOÛT 1965

INFORMATIONS

POMMES DE TERRE

Dans toutes les cultures dont les fanes ont été fortement endommagées par le Mildiou, il n'y a plus à espérer d'accroissement sensible de la récolte. Par contre, le feuillage malade restant est susceptible de fournir des germes capables de provoquer des attaques importantes sur tubercules.

Pour empêcher ces dégâts, il est nécessaire de procéder à la destruction des fanes par fauchage et enlèvement hors de la culture, ou mieux par pulvérisation d'un produit chimique :

- soit spécialité commerciale défanante
- soit Chlorate de soude à la dose de 2 kgs pour 100 litres d'eau.

La quantité de bouillie pulvérisée sera de 800 à 1.000 litres par hectare.

Il sera procédé ultérieurement à la récolte par temps sec et au plus tôt 15 jours après le défanage.

POIREAUX

- ROUILLE : Cette maladie venant de faire son apparition dans quelques cultures, pour prévenir son développement, effectuer un traitement avec une bouillie à base de Manèbe, Mancozèbe ou Zinèbe, à la dose de 200 grs de matière active/hectolitre.

AVERTISSEMENT

TOMATES

- MILDIOU : Effectuer un nouveau traitement avant le 15 Août.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

F. BARBOTIN et G. PAITIER.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.